

QUANTO TEMPO PUÒ RIMANERE IN SEDE?

Il PICC è un presidio a medio-lungo termine e può rimanere in sede dai 6 agli 8 mesi. Se gestito correttamente e salvo complicazioni, può rimanere anche oltre un anno.

Il PICC può essere utilizzato anche per eseguire **prelievi ematici** e per la **somministrazione di mezzi di contrasto**.

La gestione del PICC deve essere sempre effettuata da infermieri specializzati.

Al termine del posizionamento le verranno fornite tutte le informazioni pratiche, comprese le modalità per prenotare le medicazioni e i controlli periodici.



La medicazione deve essere cambiata il giorno seguente al posizionamento del PICC. In seguito **ogni 7 giorni** o qualora risulti **sporca, bagnata o scollata**.

Note:

Contatti

Servizio PICC:

LUN-VEN dalle 8:30 alle 14:00
al numero:

 02/26436667

Oppure inviare una mail a:

 picc@hsr.it

GUIDA PER IL PAZIENTE PORTATORE DI PICC

Prima del posizionamento

**Catetere venoso centrale
ad inserzione periferica**



Questo opuscolo ha lo scopo di aiutarla a conoscere il PICC e i suoi vantaggi. La invitiamo a leggerlo con attenzione e, se ha dubbi, prima di lasciare l'ospedale si rivolga all'infermiere o al medico di riferimento.

COSA È IL PICC E A COSA SERVE

Il **PICC** (Peripherally Inserted Central Catheter) è un tubicino che viene inserito in una vena del braccio, con l'aiuto di un ecografo e raggiunge una vena più grande.

Serve per:

- Fare chemioterapia
- Dare nutrizione per vena
- Fare trasfusioni di sangue o piastrine
- Fare prelievi del sangue



QUALI SONO I VANTAGGI DEL PICC?

- È sicuro e comodo da usare, anche a casa
- Ha bisogno di poca manutenzione
- Riduce il rischio di infezioni e di coaguli
- Non limita molto le attività quotidiane

COME VIENE IMPIANTATO IL PICC?

- Si usa l'anestesia locale, si addormenta solo la zona del braccio
- Non serve il digiuno
- Durante la procedura può sentire un leggero dolore quando viene fatta l'anestesia e un fastidio quando l'ago entra nella vena
- Alla fine, verrà eseguita una radiografia del torace per controllare la corretta posizione del PICC
- Le verrà consegnato un cartellino con le informazioni sul suo PICC

PRIMA DELLA PROCEDURA:

- Riceverà spiegazioni dettagliate e potrà fare domande
- Le sarà chiesto di firmare il consenso informato

DOPO LA PROCEDURA:

- Le verrà consegnato un tagliando con i dati del suo PICC, lo porti sempre con sé.

POSSIBILI COMPLICANZE DEL PICC

COMPLICANZE PRECOCI

- Punta del catetere in un'altra vena, il catetere viene riposizionato
- Piccola perdita di sangue vicino al punto di inserimento, si risolve con la medicazione

COMPLICANZE TARDIVE

- Catetere che si piega o si chiude
- Infezione nel punto di inserzione
- Coagulo nella vena (trombosi)

COMPLICANZE CHE RICHIEDONO IL RIPOSIZIONAMENTO DEL CATETERE:

- Rottura del catetere (rara)
- Spostamento del catetere (non frequente)
- Rimozione accidentale (non frequente)



**Comprehensive
Cancer Center**

IRCCS Ospedale San Raffaele